

Le taux de natalité est un phénomène naturel.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0373

SourceBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. (Cours de Vincennes).

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, ou Essai de physique sociale 1835](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb31163517r>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Quetelet, Adolphe (1796-02-22 -- 1796-02-22)

TITRE Sur l'homme et le développement de ses facultés, ou Essai de physique sociale

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1835

EDITEUR Paris : Bachelier , 1835

Le bus de natalité et 1 phéno naturel

370

La fir. est de 1 naissance / 37 hab en Islande
1 / 35 en Angl
1 / 31 en Fee
1 / 24 Moyenne de Sibie
1 / 20 sur # E.-U.

(Hawkins) cite par quiétude sur l'h.
I - r 73)

"Ds certains continents, ce n'est pas parce
qu'il broute + de nourriture que l'h. est +
fécond, mais cette nourriture elle-même +
abondante parce que les conditions de sa
production organique sont réunies et + sol-
males, de sorte qu'on y compte + de plants et
d'insectes." (114)

BnF
MSS

Il y a + limitation de la fec. due à
la présence de autres espèces : "si une espèce
devient prédominante, elle détermine les autres,
mais finit aussi par se détruire elle-même,
faute de nourriture et d'espace... + une

espèce vive profonde, + aussi les organes qu'on
peut trouver, sont nombreux.

→ : Le Salmone Pavonale peut être
trouvé de harengs par le nombre de leurs
yeux, tandis que le même poisson peut
devenir par le Cyprinus tina. (d'après
Bloch. Naturgeschichte der Fische I

p 250)

(p 122).

avec un Burdach ne mentionne le
pinnaculé ou fou hirs (parce que le pinnaculé
de ce point de vue est sur la tête.)

p 113.

Burdach. Phylog. II