

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-23-chem | L'unité de composition chez les \[contemporains ?\]. Item](#)[La partie moyenne de l'encéphale des oiseaux](#)

La partie moyenne de l'encéphale des oiseaux

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0376

SourceBoite_036-23-chem | L'unité de composition chez les [contemporains ?].

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Arsaki, Apostol](#)
- [Cuvier, Georges](#)
- [Gall, Franz Joseph](#)
- [Rolando, Luigi](#)
- [Serres, Etienne Renaud Augustin](#)
- [Tiedemann, Friedrich](#)
- [Treviranus, Gottfried Reinhold](#)
- [Vicq-d'Azyr, Félix](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La partie moyenne de l'encéphale du oiseau
serres 376

1/ La partie moyenne de l'encéphale du oiseau
est approximativement l'analogue de la partie
(2 tuberculaires)

- Gall, Cuvier, Arisaki, Tiedemann et
autres ont cette partie aux tubercules quadrijan-
- Trivierius: l'associe aux 4 tubercules et
au corps géniculé
- Rolando et Vieq d'Azyr: Helicoverche optica
- Beaumont y voit l'analogue de l'hemis-
phère cérébral.

2/ Serres attribue la partie moyenne à la
partie 3^{me}

à l'unité de ~~composition~~ : du 3^{me} au 8^{me}
d'incubation du poulet de serres, cette partie est
isolée sur le ~~peu~~ ^{peu} de l'encéphale.

Elle paraît se développer par les tubercules quadrij.
chez l'embryon de ch., du batracien; et chez
le poisson adulte.

à l'unité de forme et de structure. chez
l'embryon d'oiseau, ~~est isolée~~ cette partie est isolée



de tumeurs osseuses, creues, remplies de liquide.
On a vu les lésions qui, des embryons
à l'adulte, de l'os, de l'os, de l'os et de l'os.

c. Unité de conversion : les os, chez
les oiseaux recouvrent la surface des proboscides
cervicales (aqueux de l'os) ; de même
chez les mammifères de l'os pour les os ;
en outre chez les os, les os obliques ; et les
autres chez les os, les os de l'os. En
un autre cas de l'os sur le 3^e os vertébral
en os sur le 6^e os. Il en est de même
des os, de l'os, de l'os, de l'os.

"L'unité de forme, de position et de structure
sans l'unité de conversion n'est offerte à preuve
de l'os analogique que de l'os, de l'os, de l'os ;
et l'objection de conversion pour les autres
analogies n'est émise sans réponse (l'objection
de l'os)." "

Au niveau des embryons, les analogies
sont plus visibles. Mais tout ~~est~~ est
changé chez l'adulte.