La féminité primordiale

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0479
SourceBoite_036-26-chem | Philosophie de la nature. Le réflexe.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citées

- Blumenbach, Johann Friedrich
- Haller, Albrecht, von
- Peter Simon, Pallas
- Spallanzani, Lazzaro

Références bibliographiquesBurdach et Jourdan, Traité de physiologie considérée comme science d'observation
Référentiel BNFhttps://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30177066m
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Burdach, Karl Friedrich (1776-06-12 -- 1776-06-12)

TITRE	Traité de physiologie considérée comme science d'observation
LIEU DE PUBLICATION	Paris
DATE	1837/1841
EDITEUR	Paris : J.-B. Baillière , 1837-1841

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/7601?context=pdf

La féminité immortelle

"A un certain échelon de l'empire des êtres organisés, la loi intérieure à la féminité suffit pour former des corpuscules reproducteurs et conserver l'espèce" (114)

– Dans certains cas cette monogénie est régulière, et les espèces qui manquent les organes génitaux masculins.

– les Fougères : leur germe ne se dépouille jamais enveloppe et la spore lte entier devenir radicule de cette plante

– mise en valeur les cénobozoïres. Pr les autres animaux, il se peut que le mâle soient très rare.

– Des actes organiques qui d'ordinaire s'accouplent peuvent dans certains cas se séparer par monogénie

Spallanzani et Bonnet ont

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/7601?context=pdf

par le nombre des ovaires mâles
il en a y inclut le plus mâles
des plantes diöiques ou monoïques
Haller prétend qu'on n'obtient
que des individus complexes X.
– Or les saumons Pacifique sont alors
pourchassés par Phalène, Kitter par
le Puceron, Blumenbach par la cécé
monche. (p 75-76)

Burdach – Physio I.

"Une espèce qui se propage n'est jamais
sans femelle, mais bien sans mâle. Il ne
qui est procréé par son semblable a une mère et
la nature elle-ci est un pur femelle, la mère
de tout ce qui existe ... La féminité est
le mode primitif de ces manifestations de
vie ; ... la masculinité est la forme dérivée."
Ibid. p 358

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/7601?context=pdf