

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-28-chem | Hybridation. Item](#)[\[Naudin. Nouvelles recherches sur l'hybridité des végétaux - Suite\]](#)

[Naudin. Nouvelles recherches sur l'hybridité des végétaux - Suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0513

SourceBoite_036-28-chem | Hybridation.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

fondues ?... Il se peut qu'il en soit
aussi des embryons et peut-être des
premières phases du développement de l'hybride ; mais
il me paraît très probable que, contrairement
au moins à l'état adulte, c'est une ⁵¹³
aggrégation de cellules homoploïdes et uniploïdes
plus ou moins réprimées, mais réparties
quelque peu irrégulièrement entre les deux espèces et
se transformant en morphologies diverses dans
les organes de la plante.

L'hybride, d'après cette hypothèse, rend une
mosaïque vivante de l'oeil ne discerne
pas les éléments discordants tant qu'ils
restent submergés ; mais il se suit de
leur affinité, les éléments de même espèce se
rapprochant, s'agglomérant en masses un
peu visibles, il pourra en résulter des
motifs discernables à l'oeil."



"La beauté des espèces à se sembler
et à se ressembler sur des motifs différents,

l'accroît avec l'âge de la plante,
et que le moment de + en + à mesure
que la végétation s'approche de son terme,
qu'il est le mod. de pollen, de
l'au l'la formation de la graine.

cel qui ite + l'ndu + avec les
surs hnt sur rebat + t 1 de types mures

" Cette hypothèse admise, les changements
qui surviennent d le hybride de 2^{es}
généralis est de s'ins + années l'explorent
d'exp - un ; ils viennent au contraire mior-
plément non se l'admettent.

Soit 1 hybride de 2 ^{grains} ~~grains~~.

- certains de ces grains de pollen ~~ont obtenu~~
le type paternel ont dégagé; et d'autres
c'est le type maternel - de mior les ovules
- si 1 grain de pollen de type paternel (m)
féconde 1 ovule de m type, on a 1 rebat
entier du type pat ou mat.
- si le gr. de pollen féconde 1 ovule
du type opposé on a 1 fécondation croisée