

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-28-chem | Hybridation. Item](#)[\[Naudin. Nouvelles recherches sur l'hybridité des végétaux - Suite\]](#)

[Naudin. Nouvelles recherches sur l'hybridité des végétaux - Suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0514

SourceBoite_036-28-chem | Hybridation.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

514

qui redonne le type n de
l'hybride.

- si le sr. de pollen d'un type
faisant 1 ou 2 ou 3 disponibilités
un type hôte ou 2 ou 3 qu'on
etc...

Le pollen a 1 type après pollen a l'autre
explique par le fait que le type après pollen
ne peut être tout à fait exclusif et qu'il y a
"un certain sur 1 sr. de pollen d'un 1
ou 2.

4. Rien ne prouve que l'hybride
qui 1 hybride peut "stabiliser" de bien
ouche d'après. L'apparente stabilité est
un résultat de la culture.



Au lieu de sermons n. nouvelles
1863. 4^e série T. XIX

H 180. 203 \$

