

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel. ItemSprengel.](#)
[Hypothèse à propos de l'utilité des insectes.](#)

Sprengel. Hypothèse à propos de l'utilité des insectes.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0568

SourceBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

~~Heurteux~~ mal prunelle Smeyers
Hypothèse de morphologie de l'anthère
Krüning, de l'OE ökonomische Encyclo-
paedie (4. partie, p. 773) dit que le ~~rester~~
~~est nuisible et que par conséquent les anthères~~
sont ~~anthères~~ sur fl. Ainsi chacun de ses 3
arguments peut être enlevé.

568

1. 1^{er} argument : après avoir été fléchi,
le restar d'un ant épais : il obture tout le
pore et empêche la croissance du pollen.
- mais si ~~le~~ rest de fl. le restar est
très éloigné de l'ovaire ; et il peut se charger
y il veut, il ne se diminue sur lui. Par
croisement d'anthère des anthères et enlevé le
reste de fl. et le restar. (13. 14)

2. 2^d argument. Kr. prétend que le ~~reste~~
et ~~anthère~~ servent à briser les fl. ^{après} ~~anthère~~
de fl. androgynes
gynées et enlevé l'ectus du organe ^{après}
le reste enlevé (délivrance du pollen, style
mal formé)
- cette hypothèse n'est guère d'honneur
de la nature : elle tend du fl. androgynes

ne assure pas la fécondité, mais elle

se soumet à la fécondation par le pollen

- D'autre part, il y a peu de pl. dans
lesquelles on trouve le pollen de mâles
seules.

- ~~Enfin~~, si les mâles seules ne
peuvent être fécondées seules ont
l'effet, le pl. ayant du pollen (se
mâles) mais mâles) fécondation
+ fécondité que le mâle. Or c'est H. le
souvent que le pollen : car si le
fécondation mâle seul qui se fait en
même est très rare que la fécondation
par les mâles qui se fait pour mâles

- Les pl. les plus stériles
ont souvent une structure telle qu'elle
ne peuvent être fécondées que par les
abaissement de mâles.

3^e argument : la abaissement de mâles
ne peut être fécondation, nous le voyons