

Les deux plasmas.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0623

SourceBoite_036-32-chem | Weismann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Le 2 plasmies.

1. "chez certains insectes, le tout se
 trouve en un rayon c/4 m le stich-
 de ... cell. germinales "

2. Mais "chez la saignée, un ver naissant
 libéré de la mer " la reproduction se pro-
 duit au bout du segment où elle
 germinale ; chez le vertébré, cette reproduction
 n'a lieu qu'après que l'embryon est entièrement
 formé "

3. De la méduse, il y a alternance de
 génération : "les molécules du plasma
 germinatif sont portées d'abord du Polype,
 et ensuite du larve de méduse ; elles
 se reproduisent de cellules corporelles que
 les bourgeons se forment de cellules
 germinales particulières. " (BAP MSS)

"c/ il existe - la nature n'est

882
A leur sujet - une nouvelle opposition
entre l'estime du plasma de cellules
germinatives immortelles, et celle de cellules
somatiques finissantes, nous ne pouvons
relever sur ce point que ce qui dit
que d la cellule germinative, il en est
actuelle = 2 sortes de plasma qui, après
le div. embryonnaire, se répartissent l'un
l'autre en 2 formes de 2 groupes distincts de
cellules.

De l'hérédité (1883)

(Eman. n° 124)