

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-32-chem | Weismann. Item](#)[Première théorie de Weismann : plasmas ancestraux.](#)

Première théorie de Weismann : plasmas ancestraux.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0629

SourceBoite_036-32-chem | Weismann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Plasmas annexes

1. L'idio plasma

Les caractères et fonctions des cellules vivantes dépendent des cellules.

Les caractères et fonctions des cellules dépendent des noyaux.

De : La substance du noyau est le facteur universel de tous phénomènes W. appelle idio plasma, le plasma entretient les noyaux de cellules d'individu.

2. L'ouïe

A l'origine, l'idio plasma du futur organisme est tout contenu de plasma nucléaire du zygote.

Or, de ce plasma unique, vont pouvoir se former des plasmas de cellules différentes de l'organisme ?

Il faut admettre que au moins d'une division en 2 noyaux du noyau recombinaison, qualitativement. Il y a de

2. les types de divisions nucléaires

- la division homogène (qui donne naissance à des clones homogènes)
- la division hétérogyne (qui donne naissance à des clones hétérogènes).

Le cytoplasme de l'œuf contient, condensé, le cytoplasme du futur zygote. Il est de lui complexe et lui peu différencié. A chaque division, chaque des noyaux reçoit de ce cytoplasme primitif ce qu'il va recevoir par la suite.

Le cytoplasme devient à chaque division de - en + complexe et de + en + différencié. A la fin de l'ontogénèse, on atteint le minimum de complexité et le maximum de diff. A partir de ce moment là, chaque cellule ne + augmente que de celle qui la crée.

3. Le Plasma germinatif

Le ^{plasma} plasma de l'œuf est très complexe -
il peut même provenir du cytoplasme
et + simple de cellules corporelles.