

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-2-chem | Rorschach. \[D. Defert?\]](#)[ItemLe F% comme indicateur diagnostic](#)

Le F% comme indicateur diagnostic

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0035

SourceBoite_044_B-2-chem | Rorschach. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Le F% et indicateur diagnostique.

35

La moyenne de F% est entre 67 et 73% avec $\pm$ min. à 60% et $\pm$ max à 80%.

Le F+ % doit avoir $\pm$ min. de 65% et $\pm$ max de 80%.

Croupe	Nbre	F% ≥ 70	F% ≥ 80
Schizo chroniques délirants	38	39	26
Schizo paranoïdes	27	70	37
Schizo simple	6	75	62
Obsessionnels	17	59	24
Depressifs	33	76	55
Anxiété, dépression, neuro	16	75	19
contrôle	54	39	24

À la F+ %

BnF
MSS

- le % le + bas : schizo chroniques (40%)
les paranoïdes chroniques (48%), schizo
simple (55%), psychose dépressive et
dépression d'introduction (60-62%).

- le % le + élevé se trouve chez les

dépens neurotiques (85%), chez les
paranoïdes non délirants, à cause de leur
rigidité (78%), chez les neurasthéniques
(75%) et chez les sujets bien adaptés du
groupe de contrôle (75%), les hystériques
76%.

Explication p. 19.

1/ Le F% sera d'ambivalence + élevé que les
sujets aura-t-ils une structure + rigide, ou
qu'il sera + inhibé.

2/ Le F+% :

- peut signifier de l'engrenage
(cogwheeling) du processus perceptif de
associatifs; - et surtout une fonction de
contrôle critique.

② peut provenir chez les schizos et les paranoïdes,
on trouve surtout F+%, élevé dans les cas
d'épisodes aigus, et non dans les cas chroniques.
(en effet dans les aigus, il y a lutte active de
l'individu de rester ancré à la réalité)

③ chez les Dépressifs, le flux associatif est
bloqué, mais l'organisation perceptif con-
tinue à être bonne, et tend vers l'abstraction.
Mais le F+%, diminue dans les cas