

La vitesse de réaction

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0038

SourceBoite_044_B-2-chem | Rorschach. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La vitesse de réaction.

38

Le temps de réaction est le temps intervenant d'après la présentation de la carte, et l'apparition de la 1^{ère} réponse sensorielle.

C'est à la fois un acte et un acte de pensée.

A Chez 1 sujet normal

1 Le temps p. i. long

- si la tâche est difficile à organiser à 1 niveau qui représente le temps en niveau sensoriel (comme chez les sujets intellectuels)
- si la carte sur une multitude d'impressions simultanées, si bien que les processus associés exigent du temps pour l'intégration des impressions.
- si le mode spécifique d'adaptation du sujet est tel que la confrontation avec des situations d'urgence est difficile.

2 Le temps p. i. court



- si la sensibilité perceptive est rapide, ainsi que les processus associés.
- si ses standards de production sont bas : il verbalise rapidement ses perceptions.

- si il y a \pm h² degré de stéréotypie
- si la plasticité du sujet lui permet de donner H du unit I réponse pure, donnant par la suite des réponses + complètes + originales

B Chez les sujets patho

1 Long temps de réaction :

- retard 40 ms pour le blocage
- doute, incertitude
- résistance anxieuse à articuler ce qui apparaît d'abord cf \pm mot perception anormale
- 1 partie de la corte récept H_e est atteinte (rouge des cortex II et III)

2 Temps courts

- réponses arbitraires sans interférences critiques
- gde rapidité 40 ms
- qd \pm aspect de la tâche peut servir de support à l'idée prévalente du sujet (réponses nouvelles ou agencées)

Les cortex qui sont en + sont :

I, II, VIII : en 2 l^{rs} à cause de la structure unitaire. La VIII à cause du 3 l^{rs} articulé (animal) qui n'est obtenu qu'à 2a 1/2