

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-3-chem | Hull. Item](#)[\[La théorie du learning de Hull \(suite\)\]](#)

[La théorie du learning de Hull (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0053

SourceBoite_044_B-3-chem | Hull.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

primaires qui sont actifs à moment donné.

53

Les habitudes préexistantes devant être
actives produites: note le comment elle se
sentent M.

e/ Ceux qui concernent les obstacles à
la réponse.

8 : Provocation de n'importe quelle réaction
provoque une inhibition réactionnelle. Cette inhibi-
tion disparaît spontanément avec le temps.

9 : Le stimulus associé à la réaction et la réponse
devenant des inhibiteurs conditionnés. (inhib.
cond.)

10 : Le potentiel inhibiteur associé à chaque
potentiel de réaction, oscille en quantité de
moment en moment.

De l'extinction de ~~la~~ réponse non
renforcée à un tel que l'un spécial de la réponse
de l'extinction des réponses et de se pointer à l'extinction
à leur propre répétition.

BnF
MSS

f/ Ceux qui concernent l'extinction de
la réponse.

11 : Le ~~maximal~~ potentiel de réaction effectif
est supérieur le temps de réaction jusqu'à

stimuler puis évoquer 1 réac. donnée

12 : la possibilité de la réponse 17 nouvelle série est 1 fonction normale de la quantité 17 le potentiel de réac. depuis le seuil de réac.

13 : + le potentiel de réac. depuis le seuil de réac. + le temps latence de la réponse est 1 même série de courbt.

14 : + le potentiel de réac. effectif est qd, + 17 points de réponse non renforcés se trouvent jusqu'à 17 renforcés.

15 : l'amplitude des réponses unitaires du système nerveux autonome croît en proportion directe de la force de la réac. effectif.

16 : qd des potentiels de réac. à mieux répondre incompatibles se produisent 17 organisation moment, seule est évacuée la réaction 17 le potentiel le + élevé.