

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-5-chem | \[Psychophysiologie\] de l'apprentissage. Item](#)[\[Rôle du système nerveux central dans l'apprentissage \(suite\)\]](#)

[Rôle du système nerveux central dans l'apprentissage (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b044_B_f0090**

Source**Boite_044_B-5-chem | [Psychophysiologie] de l'apprentissage.**

Langue**Français**

TypeFiche**Lecture**

Personnes citées**[Soulairac](#)**

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

à lésion visuelle adoptant la solution de
construction 3^{de}, et inversement.

90

- Krechevsky, tente de tester + à fond le pb
de l'hypothèse spatiale.

Il utilise 1 labyrinthe comportant 21 solutions
spatiales. Les animaux n'ont utilisé que
les solutions.

qd on pratique des lésions corticales (ablations
sans focalisation stricte), le nombre de solutions
diminue. + la lésion corticale est importante
moins l'animal est capable de solutions multiples.
A + de 25% d'ablation du cortex, l'animal a
solution str, y maintient, et non la focalisation
(c'est-à-dire que k. appelle "action de moule").

- K. utilise 1 3^e type de labyrinthe: 2
solutions: 1 normale, 1 en miroir 1 chemin
alternant simple.

Ⓐ Rats normaux: 1 pour 2.

Ⓑ Opérés: 180% alternance
120% solution filée

s. le 2^e ch. est + long, les opérés choisissent le +
court (le moins efforcé).

q'd les chemins sont d'égale longueur, d'écarter
sans s'écarter, les animaux lésés ont tendance à
choisir la solution signalisée par du lumière.

BnF
MSS

- Exp de Morgan et Wood (1943), laby-
rinthe, 1943. Labyrinthe NT, avec cer-
veau du 2 côté.

② 80 ou 90% du normale manifestent 1
alternance régulière.

③ opérés : - lésions occipitales : 1/2 NT
- lésions frontales du pôle :
l'animal se mouvant à 1 cot.
stéréotypée droite ou gauche (les
lésions n'ont aucune influence sur la
motricité).

SP

Sen Pairac (Cours 53.4)