

Pathologie des mouvements volontaires

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0111

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Baruk, Henri](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Pathologie du mouvement volontaire.

Mvt vol : acte spontané, coordonné, souple et adapté, exprimant l'unité et la liberté de la personnalité en vue d'un but librement choisi.

A Caractères morpho

- mvt spontané $\neq$ du mvt de défense
- coordonné : caractère global
- souple et adapté (cf la chorée de Huntington, les gestes sont coordonnés, mais ni souples, ni adaptés)

on peut faire l'étude physio de ce mvt. par la chronaxie (mesure d'excitabilité des divers muscles) :

- chez les lésions du cortex du cerveau, les rap. chr perturbés
- chez l'hémipégique, ils sont renversés
- chez l'hystérique, les rapports sont exercés, mais les chiffres sont changés et leur ensemble.

A l'état normal, pas d'achondrie les organes ; qd la volonté est affectée, les variations $\neq$ sont des variations organiques. (le geste est piloté par la volonté de réflexion ; s'il s'agit de la volonté organique, c'est par affectation).

B Caractères ψ BnF
MSS

Caractère de synthèse personnelle : en l'absence de cette synth, sentiment d'automatisme.

Dégénération de l'acte volontaire

En attendant de le voir de l'épigraphie

1/ Acte impaire p. 0 : acte morphologique volontaire, mais il ne se présente pas (propos, soit des années)

Physiologie : — m. c. a. que p. l'acte vol., mais le temps et les modes de ce courant sont $\neq$ les

— polarisation de ce courant : il y a qd on le connaît, y qd on le crée

— et la cataplexie, irrégularité cataplexique.

2/ Impulsion : déclenchée par des moires internes, ~~et~~ ~~et~~ ~~et~~

— chez les cataplexiques, l'impulsion est une : "mora hypoboulisme" (Kretschmer)

— chez les épileptiques, non consciente ; réalise souvent des actes compliqués

— Automatismes idéo-moteurs : idéogrammes réalisés sans frein : mot de machine ; rire

— Automatismes gestuels : grimaces, pathétiques.

— Automatismes neurologiques : rires et pleurs spasmodiques pseudo-émotionnels.

— Automatismes émotifs : du type de la crise pseudo-émotive du chien de cérebrum ; larmes redoublées / larmes priétaires (cf choré athétose)

— Syncinésie

— Rigidité de cérebrum

Tous ces phénomènes peuvent être obtenus par des agents pharmacodynamiques (Baruch et Claude, en 1928 avec somnifères, augmentant l'automatisme en augmentant la dose)