

Liquide céphalo-rachidien

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0118

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Liquide céphalo-rachidien

118

1/ est 1 humeur accumulé à l'extrémité du neuraxe et les espaces sub-arachnoïdiens -
100 à 150 cm³

Tension : 60 gouttes par minute.

Pression : 10 à 15 cm de manomètre

2/ Sa composition normale :

eau ; sels minéraux ; glucose ; 1 peu d'albumine ;
1 ou 2 lymphocytes par mm³.

Analyse du liquide C.R. ds la PG

1/ Hyperalbuminose : dépasse 0,30 grammes par litre.

2/ Hyperlymphocytose : > 3

3/ Réaction au benjoin colloïdal :

le benjoin coll + liquide C.R. $\rightarrow$ la solution se trouble en flocons (réaction de floculation)

$\left\{ \begin{array}{l} - \text{qd la réaction ne se produit pas} = 0 \\ - \text{qd elle est légère} = 1 \\ - \text{_____ forte} = 2 \end{array} \right\}$

BnF
MSS

si la réaction est forte ds les 7 1^{ers} tubes,
c'est 1 réaction d'infection chronique.

