

Épilepsie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0119

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Pathogenie

- 1/ Inhibition corticale passagère, se traduisant:
 - par des déficits (perte de conscience; automatisme; aphasie; cécité; paralysie postictale)
 - par des élévations: convulsions toniques par le bulbe
| cloniques par la motricité
| avec rythme par le système nerveux
- 2/ Susceptibilité corticale (due à l'hérédité; lésions méningées, infection infectieuse)
- 3/ Facteur immédiat: humoral; tendu à l'acidose avant, à l'acidose après la crise.
- 4/ E.E.G.:
 - avant la crise, rythme de 30 (amplitude 10 ou 20 + quelque α)
 - au cours des équivalents: δ
 - petit mal: complexe pointé-onde

thèses particulières se retrouvent jusqu'à sur les crises d'épilepsie.



