

## [Les démences (suite)]

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb044\_B\_f0122

SourceBoite\_044\_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

- Les excitateurs du système symp. élèvent la tension & cette fonction vigile (amines sympatho-mimétiques) : médicaments psychotoniques.
- Les barbituriques au contraire mènent à la exc. musculaire ; med. psychotiques.

### A Les psychotoniques.

Troubles de choc après en 1940 dopés avec l'échlophosphate amphotaminique. découvert par Auschitz = ~~amphé~~ -

- par voie buccale : amélioration physique, intellectuelle objectivée par les tests.
- par voie intraveineuse : excitation intell. et émotionnelle → forme hypomaniaque jusqu'à la fuite des idées. L'exaltation de l'humeur.

Application en psychiatrie : avertissement, excitation, levée des inhibitions.

### I Intérêt diagnostique.

#### ① Psychose maniaco-dépressive :

c'est l'hyperthymie, l'élévation de l'humeur au-dessus de l'euphorique et expansive ; soit la forme ancienne et rétrogradée.



chez les mélancoliques on trouve la 2<sup>ème</sup> forme ;  
chez les maniaques, la seconde.

Le choc amphéthéminique renforce le  
tableau clinique ; ce qui n'a aucun intérêt qd  
le cas est évident ; mais ds les cas douteux et  
ambigus, il permet 1 diagnostic (un mélancolique  
stupéfié : sa stupéfaction peut être confusionnelle  
ou mélancolique ; le choc amph. permet l'explo-  
sion des thèmes d'anxiété).

Ex : 1 malade stupéfiée ; ss le choc  
de l'ir mélancolique avec auto-accusation :  
j'ai tué mon enfant avec 1 rasoir ; je méritais  
l'échafaud. Cette mélancolie fut guérie  
pr l'c. choc.

## (2) La schizophrénie.

d. le choc amphé. permet 1 accentuation  
du tableau (ambivalence, dissociation, manie-  
re). Intérêt diagnost. on le compare avec  
les tests (Rorschach) : avant le test est peu  
diagnost., après ce thème.

## (3) Le délire paranoïde.

Ex : 1 malade : trouble de l'audition, mais sans  
le polymorphisme propre aux dégénéres. Après  
le choc apparaît le délire de persécution.