

La psychochirurgie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0130

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La Psychochirurgie

130

I. Ps. chir. lésionnelle

1/ Tumeurs cérébrales: sur 406 tumeurs opérées, Buch trouve 102 cas où dominent les troubles mentaux

Diagn. diff. est important: manie (presque jamais avec la tumeur) et morie (syndr. préfrontaux): et la morie, il n'y a ni fuite des idées, ni mobilité de l'humeur (euphorie perpétuelle)

2/ Hyper tensions intracrâniennes: engst, céphalées, crises convulsives, certain degré de somnolence.

3/ Méningites séreuses: crises convulsives, troubles du caractère (excitabilité).

II. Ps. chir. fonctionnelle.

A Les sections.

Lobotomie, leucotomie,
Thalamotomie, excisions
du cortex



BnF
MSS

Lobotomie: section totale du
pôle préfrontal

Leucotomie: section sélective
(leucotomie en guêpière)

L: Lobotomie

E: Tryptotomie

T: Thalamotomie

S: section sélective

Technique de la leuco- ou lobotomie transorbitaire

B Les résections:

Tryptotomie (transorbitaire jusqu'à la

gyrectomie ou Collectomie). De 1 ropectomie normale, on enlève 10 à 12 gr. de cortex préfrontal (aires 9 et 10 de Brodmann). De Lay et Pusch font des ropectomies à minima (obtient p + qu'il n'en put pr / l'opéré c'est bon)

Indications et résultats

1/ névrose obsessionnelle : la lobotomie ne supprime p les obsessions, mais en réar. de la person. vis à vis d'elle.

Gerard : 45 a ; névrose obs. grave (pour des sacrilèges, nécessité de ruer en objets). Aucune thérapie réussit. La lobotomie : → éch. vert. ; euphorie ; excité reviv. Réunit d. 1 situation cycl. 9 ans obsession (rit. : versier sit. à un du lieu ...) : chem. d. l'ité.

Libération à l'égard du surmoi : mais on voit apparaître des tendances agressives.

Murphy : 125 malades :
19 résultats excellents
71 bon résultats
6 médiocres
14 échecs

2/ l'impulsivité

La lobotomie est en cas où l'électrochoc ne donne p de bons résultats.

E+ : lts