

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie. ItemPsychochirurgie \(Évolution psychiatrique, 1949\)](#)

Psychochirurgie (Évolution psychiatrique, 1949)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0132

SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Bridel -

(Ev. - G. J. J. J.)
1949)

Histoire

- Théorie théorique: Moniz pense que la rigidité mentale des yeux est en rapport avec la stabilisation des voies synaptiques (perte du contrôle des xibles plaisants du cortex)

- Vérification expérimentale de l'opération: chimpanzé de Fulton qui faisait des réactions névrotiques lorsque le problème-fox n'était pas l'un des chiens familiers.

Ablation des 2 aires préfrontales → + de névroses
"C'est l'effet placé les esprits entre les mains de 4."

D'où:

- opération de Moniz et de F. J. J. J.: Leuco-tomie. (le dernier par voie transorbitaire)
- Freeman et Watts: déconnexion complète des aires préfrontales.

Variantes opératoires

1/ Leuco ou Polio-tomie

BnF
MSS

2/ Ablation corticales, on a tenté, non les cylichthes, mais leurolomie cortical:

- gyrectomie
- topectomie: suppression de la zone la + rostrale

- 3/ Leucotomie préfrontale
- 4/ Thalamotomie

Rappel anatomique (1) La dissection de l'air frontal se fonde sur

- 1 caractère histo lg : abaisse de gM et les mo-
lécules et présence de couches granuleuses
- 1 caractère physio : irascible par les excitations
corticales électriques habituelles.

- (2) Rapport entre air frontal et thalamus
- lésion des axes 24 et 32 : dégénération noyau 24
 - ————— 9, 10, 11, 12 ————— dorso médian
 - ————— 45, 46, 47 ————— noyau à con-
nexion hypothalamiques

Troubles y front

1/ humeur et caractère :

- sont euphorie béatifiante sur / end d'apathie
- — — — — — sur excitation à l'émotion (moria)
- sont irritabilité (→ pervenité)

2/ Acheté : manque d'intérêt → torpeur

3/ Troubles du fonctionnement des la 14 et 15 (Agyria)

Personnalité du lobotomisé

1. Perte de la composante émotionnelle
des activités