

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-8-chem | Intelligence et neurologie. ItemL'index de détérioration et les lobes frontaux](#)

L'index de détérioration et les lobes frontaux

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0147

SourceBoite_044_B-8-chem | Intelligence et neurologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'index de déterioration de la polv
fronte

1/ Aucune polychromie frontale (droite ou gauche) u₂ ± index de déterioration inf^r à .5

2/ la moyenne de l'indice de déterioration par les dix neuf cas de lésions non frontales est de .26, et le groupe n° .13.

De la déterioration est 5 ou 6 fois + gde par la polychromie frontale que par les yeux n°; 3 ou 4 fois + gdes que par la polychromie non frontale.

Lobe frontal		Lobe temporal		Pariét.		Occipit.	
D.	G.	D.	G.	D.	G.	D.	G.
.9	1.0	.2	.2	.4	.2	.2	.2
.9	1.0	.3	.1	.2	.1	.2	0
.9	.7	.2	.0		.6		.1
.5	1.0	.2			.7		
.6	1.0	.2					
.5	.9	.9					
.0	.7	.9					
.8	.7	.8					
.8	1.0						
1.0	.9						
.8	.8						
1.0	.7						
	.7						
<hr/> Moy. .78 .86		<hr/> .43 1.0		<hr/> .30 .40		<hr/> 2.0 .10	



