

Les effets de l'anoxie expérimentale

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0149

SourceBoite_044_B-8-chem | Intelligence et neurologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

des effets de l'anoxie exp. ob.

149

Effets g^T:

- ① il y a des diffé^{individueles} marquées ds les réactions à l'anoxie
- ② les effets y eg. et physiolo de l'anoxie (un dehors du collapsus total) sont complè^m réversibles.
- ③ le cerveau, et spécialement le cortex, est de ce corp, l'organe qui est le + sensible au manque d'oxygène.

Exp^{te}: on place 7 sujets masculins de 17 à 28 a. ds 1 chambre à décompression (de façon que la pression soit équivalente à celle qu'on trouve à 3000 m d'altitude) les sujets y restent de 4 à 6 h. par jour; 6 jours par semaine; et 1 période de 4 à 6 g^{rs} matin.

Effet:



y sur "central integrative field potential" du pit pour la révision Stanford de B.S. qui a 1 corr. de 0.80 avec le test le + chargé un potentiel C. Epreuves au début et à la fin de l'exp^{te}. Aucune diffé^{notable}

Atte 9. I. De m, pr le but de pénétration
catégorique.

Pr tout, il faut noter = rétroaction de l'en-
vergure de la csc. de de l'attention. Le
sujet a 1 impression d'attente. On soumet 1
sujet à 1 "airplane spotting test" on présente
des silhouettes d'avions pdc 1/5e de seconde
à 1 situation de choix multiple. Le sujet se
plaint de pas pouvoir voir la forme, surtout
l'absence d'identification correcte.

2/ Sur le facteur A: aucune altération
pdc ni apr pvc. Le pdc A, en effet, est
1 pdc "logique" ancien.

3/ Sur le facteur P: pdc la période de de
4 semaines à 3.000 m/h, la fréquence de pvc
critique obtenue moyenne de 3 à 4 cycles par sec
+ base qui avant et apr.

De m 3 sujets sur 7 éprouvent des difficultés
avec l'absence de discrimination.

L'absence de facteur P est reflétée ici par 1
effet d'extinction ou de diminution de la corrélation,
de la stimulation concomitante crée au
niveau de la périphérie.

4/ Sur le pdc D: tout lui qui charge (-52%)
la composante périphérique du but de charge.