

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.](#)
[ItemLésion du lobe frontal](#)

Lésion du lobe frontal

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0185

SourceBoite_044_B-9-chem | Pichot. Les tests et la psychopathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Goldstein, Kurt](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Rylander : opéris de Stockholm (lobe frontal)

marketing des malades

West Bühler et Kuffe : figures sur 1 carte
des syllables (sauf 2) ; puis figures et choix
multiple où il faut retrouver celle qui
est en double.

Addition continue de Knepler

à son fort nivel

opéris de mots als hat h

Halsbad

- Form board record (Beguim + unumut)

- catégories

- huping

- flicher : le vent et + 'é levé' et +
fluctuant que chez les normaux



cf. art de Klebanoff.

Goldstein : on a vérifié les théories sur le
lobe frontal, avec le shifting chez
les infes.

Lashley a montré chez le rat des
signes frontaux, avec lésions occipitales

Pérgolone

Lobe occipital

sur le lobe occipital

(Text frontal)

Lobe préfrontal

Syndrôme de garman : agression des doigts

(mouvements + inégalité de force)

à la suite de lésions frontales

de la région frontale

Distorsion : un verrouillage de la main sur le
tableau, avec des difficultés de
la main.