

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-10-chem | Massermann. Item](#)[Les principes biodynamiques du comportement](#)

Les principes biodynamiques du comportement

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0189

SourceBoite_044_B-10-chem | Massermann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les physiodynamiques du cét.

A) Type de motivation

Le cét est activé par des besoins physiologiques de l'organisme, et il est dirigé vers la satisfaction de ces besoins.

Tout ce que l'on peut dire de motivations (instincts, pulsions, envies, vœux, valeurs) ne fait que décrire les diverses manifestations de la même fonction à l'homme ou à l'animal.

Ex : du bébé privé de phosphore mangera des os. (Green 1915) ; Curt Richter a montré que des rats adrénalectomisés, qui avaient des besoins de sodium cherchaient des solutions salées ; d'autres rats curieux qui ont eu l'excès de la parathyroïde cherchant sur terre du calcium. (1939-41). Clara Davis (1928) a observé un rat nichitique, qui avait besoin physiologique de vit D choisissant parmi plusieurs aliments, et d'une manière spontanée l'un d'eux de la même.

Conclusions :

1. Les déterminants physiologiques du cét sont surtout internes ; mais qu'il y ait un besoin devient aigu ou qu'il y ait un pattern d'adaptation exigé de l'animal.



compliqué, alors la cir. apparaît

2 Les besoins physiolo peuvent servir la survie sociale, en contradiction avec celle de l'individu (par ex. le comportement venant au malin avec leur induction hormonale).

3 Les formes de cpl. varient avec la nature et l'interaction des besoins, à tel que leur complexité et leur ~~variété~~ ^{variété} dépendent de la capacité perceptive, intégrative et réaction de l'individu.

4 Les patterns de comportement peuvent persister c/fonction de l'organisation hiérogam, après que le déterminant physiolo direct aient disparu.

Ex. 1 animal mort, après 1 de pub d'activité sexuelle est castré; il peut continuer une activité. De m, une s'arrête de manger q'd on leur décrit p'm; comportement d'autohypnose.

Ex. 2 de mch patterns sont-ils communs? p'ch. ref. circ. pair c/ leur analyse par Ousey de Baren, Lorenz de Mo, Mac Culloch.

5 Les patterns d'adaptation sociale représentent l'expression complexe de besoins relationnels. Du p'de mch hiérogam que la motivation culturelle repose sur des besoins individuels primaires.