

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_044\\_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite\\_044\\_B-10-chem | Massermann. Item\[Les principes biodynamiques du comportement \(suite\)\]](#)

## **[Les principes biodynamiques du comportement (suite)]**

**Auteur : Foucault, Michel**

### **Présentation de la fiche**

Coteb044\_B\_f0191

SourceBoite\_044\_B-10-chem | Massermann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### **Références éditoriales**

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

- substitution de buts intermédiaires : Par exemple  
rapport que si on ne donne pas de nourriture après  
le signal, l'intérêt se reporte sur le signal (le  
chien vient chercher la punaise). 191

- agression substitutive de l'interpersonnel  
Ex : 2 chats ont été en laisse à répondre à  
1 signal en ouvrant le food-box. On les met dans  
la même cage. Ag et 2 chat devenus dominants. Mais  
si on empêche le chat dominant de prendre  
la nourriture soit en introduisant un 3<sup>e</sup> animal  
plus hâtif que lui, soit en créant chez lui 1  
phobie au signal, il se devient agresseur  
à l'égard du 3<sup>e</sup> animal dominant. Si l'on  
a pu dominer la situation, l'agression disparaît

2) Interprétations des patterns agitatifs  
et du besoin.

Il y a 4 échelles de comportements substitutifs  
pour un besoin : par ex le besoin maternel  
("maternal drive" de Benedek et Rubin) peut  
avoir des substitutions normales (devenir  
maître d'école), social-maternel (agression  
à l'égard des enfants), névrotique (aménorrhée  
hystérique), pathologique (délire de grandeur et  
de persécution)

Le comportement substitutif peut prendre 1 forme  
non pathologique, mais + simple = pathologique  
régressif.

c/ substitution d'activités partielles de lieu de  
patterns totaux.

- substitution de la mimique s'insère au pattern total (mimiques coloriques, morphologiques)
- but partiel : la partie c/ but partiel de l'organisme.
- formation symptomatique : sympt. hystériques, dysfonction<sup>n</sup> = xosomatique
- agression substitutive : par ex. ~~et~~ la cure, qd le malade transfère sur le psychanalyste un besoin de protection maternelle, et qui, ne se voyant pas satisfait, se charge d'agresser.

### Il en résulte au III

- 1 de substitution du pattern de cet est remplacé par l'intercept<sup>n</sup> partielle du troisième corps et leur interchangeabilité et le mode de satisfaction.
- 2 le niveau hétéronique minimum dépend de facteurs = individuels, culturels et intercurrents
- 3 qd les buts sont difficiles à atteindre, l'énergie est dirigée vers des buts proches et immédiats
- 4 en cas de frustration, les satisfactions partielles peuvent servir symboliquement aux lieux et places de patterns totaux
- 5 As des circonstances analogues des énergies peuvent être dirigées en agression substitutive