

La résolution de conflit et la thérapeutique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0196

SourceBoite_044_B-10-chem | Massermann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La résolution du conflit et la 196 thérapeutique.

1/ Entraînement profond de la situation
névrotique.

Exp¹ : 1 chatte de 4 mois rendue névrotique,
elle est gardée p^{er} 8 semaines d^{ans} 1 maison.
Son agitation, ses phobies (lumière et son),
son aversion p^{our} les espaces fermés diminuent.
Difficulté p^{our} la nourriture; aucun apprentis-
sage de la propreté, agressivité à l'égard d'
un très petit chat; comportement destructeur.

Elle passe ensuite 10 mois avec d'autres animaux.
A la fin de l'année, elle est privée de nourriture
p^{our} 1 j. et replacée d^{ans} la cage exp¹.

- d'abord inquiète, elle lèche les bords
2 fois; la 3^e fois elle a 1 réaction phobique
- puis l'inquiétude s^{ur}; elle reste immobile
d^{ans} 1 coin aussi loin que possible du food box
- le signal lumineux est donné; signes physi-
ologiques d'anxiété; tentatives frénétiques d'échapper
à la cage
- replacée d^{ans} sa cage, elle montre des inhibitions
à la nourriture, des réactions de sursaut et
de phobie aussi intenses que l'année précédente

BnF
MSS

2/ Diminution des pulsions conflictuelles.

Exp: $\pm$ animal qui a $\pm$ aversion phobique
à la nourriture est nourri au tube stomacal.
Replacé la situation exp^{te}, diminution
de reac. phobique au signal de nourriture.
Mainte pour suivre, qd la pun est aussi forte
les reac. neurotiques retournent aussi intenses.
Si on répète trop souvent cette meth, l'extinction
artificielle finit par provoquer elle-même
des reac. phobiques.

Cf. chez l'h. les obs neurotiques et des
cas de frustration sexuelle, on la "psychosis
gravidarum" guérit par avort^{em}.

3/ Solution contrainte du conflit.

Est $\pm$ animal neurotique affamé et replacé
la cage exp^{te}; par $\pm$ barrière mobile on le pousse
vers le food box; les signes d'anxiété et
de phobie croissent, jusqu'au bord de la
panique. Alors on ouvre la boîte, on y a
des aliments particuliers $\rightarrow$ attractants par
l'animal. Il se jette sur la nourriture, s'alourd
hâtivement, puis s'écroule avec voracité. A partir
de là les symptômes regrettent. A plusieurs
nourritures forcées, l'animal cherche à n^o
à entrer et la boîte, répond favorablement aux
signaux de nourriture. Bien +, il c/est