

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-10-chem | Massermann. Item](#)[\[La résolution de conflit et la thérapeutique \(suite\)\]](#)

[La résolution de conflit et la thérapeutique (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0197

SourceBoite_044_B-10-chem | Massermann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

réagir au soufflé d'air lui-même a 1 signal
de nourriture, au du moins on peut l'entraîner
à cela.

197

Chez certains animaux qui ont des
névroses graves, panique et exacerbation
des réac. névrotiques.

4/ Emploi des relations de transfert et du guichet et le retraining.

1 animal est rendu névrotique ; on le replace
et l'écage pr réster ses réactions. Tant qu'il
est à l'écage, l'écage le flatte, le caresse, le
nourrit doucement jusqu'à ce qu'il réac.
d'anxiété et l'effort pr se débarrasser d'appréhension
on recommence + on lui donne des food-box, jusqu'à
ce qu'il vienne chercher la nourriture et le
main de l'écage à l'intérieur du food box. A ce
moment l'animal ne peut manger que
s'il est flatté ; + tard l'animal peut prendre la
nourriture directement de la boîte, à condition
que l'écage soit présent. Le même signal
cond. induit à la fois les réac. névrotiques.
On peut ainsi re-entraîner l'animal
à toucher les boutons, à bien accueillir
le soufflé d'air.

Pour finir, moi-même, l'animal continue
à avoir peur de l'écage : le retraining
serait impossible.

BRF
MSS

5/ L'interaction sociale de l'anxiété.

- L'animal neurotique affaibli est placé dans la cage expérimentale avec 1 chat normal en trainé. L'animal neurotique a des réactions de phobie, mais au bout d'un certain temps, il se met à imiter le chat normal ~~jusqu'à~~ d'abord parfois peu et peu complètement. Si on enlève le chat normal, la inhibition de la nourriture recommence et les réponses phobiques (ou phob). Mais après plusieurs associations avec l'animal normal, les réactions neurotiques peuvent disparaître.

6/ Le Working through expérimental.

Exp : on a provoqué 1 neur. exp. qd on remet l'animal dans la boîte exp., par une anxiété neurotique, il se ratte le "bouton". C'est le conflit d'approche la peur croît, l'anxiété devient de + en + manifeste. Quand peu à peu le chat s'approche du bouton, puis finit par le toucher très doucement sans que ce contact forte produise le signal. Qd il l'a touché assez long, son comportement change, et il se touche maintenant. Puis les patterns d'approbation sont réintégrés mais sur 1 mode très rapide puis finit par avoir la neur.

Si on le ramène à l'état d'1 soufflé d'air, parfois patterns neurotiques réapparaissent.