

# Psychologie du conflit

**Auteur : Foucault, Michel**

## Présentation de la fiche

Coteb044\_B\_f0199

SourceBoite\_044\_B-10-chem | Massermann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

## Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

Alimose exp.

1 chat est dressé à répondre à 1 flash en ouvrant 1 food box ; puis à appuyer sur 1 bouton pour tendre ses signaux de fonte.

Si à 1 moment on déconnecte le fil du circuit des barrières de telle manière que l'animal ne puisse + attraper la nourriture, il manifeste 1 cpt substitutif, jouant avec le fil etc. Bientôt l'animal se prête + aucune attention aux signaux et au food box. mais il ne manifeste aucun comportement de peur, et il faut lui rien faire.

mais à 1 certain moment l'animal peut attraper la nourriture, mais qu'à ce moment il est soumis à 1 souffle d'air ou à 1 choc électrique, à ce moment l'animal est sollicité par 2 patterns opposés de cpt.

L'animal a alors 1 cpt qui se peut rapprocher de celui du neurotisé humain.

1 Anxiété : l'animal tremble, est hostile ; pupilles dilatées, respiration rapide et irrégulière, 1 pouls rapide, et 1 pression sanguine qui s'élève. L'o est en état d'urgence.

à la sang.

2/ Phobies, réactions en sursaut, hypersensibilités  
Les reac d'anxiété → qd un signal se produit  
qd l'animal est forcé de s'approcher du food box,  
ou qd on lui offre de la nourriture. D. 1/2 sec +  
g. l'animal refuse d'entrer et la boîte à  
expi, il peut l'éviter. In cas de cage, il a des  
reac. en sursaut aux flashes, aux bruits des  
boutons électriques.

3/ Inhibitions et repressions.

Les animaux peuvent refuser de nourrir, ou  
du moins avoir des inhibitions partielles (par  
la nourriture présentée et l'odeur ou l'aspect des aliments)

4/ Troubles moteurs et ext. compulsifs.

Ds des cas de névroses sévères, il peut y avoir  
1 immobilité cataplectique, ou encore 1  
hyperactivité continue et sans but. On peut avoir  
des épisodes intermédiaires :

- conduites "compulsives" : 1 animal  
névrotique affamé peut cacher sa tête et  
le food-box en réponse au signal de  
nourriture, et cesse de manger
- 1 animal chat peut avoir peur d'ouvrir  
et 1 cage, parce qu'elle a touché la boîte  
à expi au moment de l'alimentation