

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-10-chem | Massermann. Item](#)[La névrose animale selon Masserman](#)

La névrose animale selon Masserman

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0203

SourceBoite_044_B-10-chem | Massermann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Psychobiologie dynamisme in behavior
Psychiatry - 5 - 1942

A On provoque 1 neurose exp de chat 1 chose
en le conditionnant à la lumière par la nourriture
et en le soumettant à 1 soufflet d'air violent
au moment où il a atteint la nourriture.

- Il suffit d'un 2 exp^s pour provoquer la
neurose exp^e, que se manifeste date sign^s lumineux

- Or la réaction neurotisque au signal
lumineux sont moins marquées si l'animal
a été nourri à l'avance.

- Si la neurose a été éliminée par 1
réentraînement, on peut par des moyens thérapeu-
tiques, le soufflet d'air peut devenir 1
signal conditionné par la nourriture.

B Bien entendu, les patterns de ce
neurotisque diffèrent en efficacité, en temps,
en durée, en étendue spatiale et temporelle,
en finesse et en complexité, s/ les espèces.
Les patterns p^{tho} dépendent "de capacités
sensorielles, perceptives, intégratives et motrices."

Ainsi chez le chat le corps ^{ne} neurotique
se manifestera sous ^{la} forme
- du refus de nourriture ; de l'hypocathésis ;
des phobes rudimentaires ; des compulsions ;
du regression et des fixations.

⊆ Ainsi chez le chat soumis à situation
de conflit pr la nourriture, on trouve :

- une anxiété chronique, de la situation
crée ou à l'élément : agitation, tremble-
ment, besoin de se cacher, réponses vives aux
stimuli sensoriels mineurs.
- une série de réponses phobiques aux stimuli
symboliques de la stimulation émotion-
nelle implicite. L'animal répond
au signal nourriture, qui était autrefois
bien accueilli, par des symptômes d'anxiété,
et des efforts pour échapper au voisinage de
la nourriture. Ces bords animaux vont
jusqu'à la cachexie.
- Des phénomènes de regression et de défense :
Pendant la période neurotique, les chats
adultes comparés de petits chats (kittenish
behavior) : ils se cachent eux, deviennent
maussades, se montrent agressifs à l'égard
du humain.