

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.](#)
[ItemLes manifestations motrices spontanées chez l'enfant. Marcel Bergeron](#)

Les manifestations motrices spontanées chez l'enfant. Marcel Bergeron

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0211

SourceBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

des manifestations motrices spontanées
chez l'enfant.

211

Marcel Bergeron.

Résumé des observations. (sur 1 vingtaine,
avec 2 mi pr type)

1. L'altitude

- Chez le nouveau né : en flexion (adduction des bras ; avant bras fléchis 5 sur 10 ; ^{int}bras sup^r 7 sur 10) ceci p^{ot} t^t le 1^{er} mois ; ce qui est l'altitude du fœtus in utero.
- Chez âgé de 1 mois : à 1 mois 5 fois sur 10 en flexion ; 4 fois sur 10 en extension ^{ultra}l^{te}. mais les membres sup^r restent fléchis, alors que les membres inf^r sont étendus.
- Puis la flexion va à nouveau diminuer (4 fois sur 10 de 42^e au 51^e jour) et diminuer : 6 fois sur 10 vers le 2^e mois.
- Entre le 2^e et le 3^e mois, les membres sup^r apparaissent en extension (6 fois sur 10) ; mais vers le 80^e jour l'altitude revient fléchir.
- Puis vers 3 mois, les tendons à l'extension paraissent nettes. (2 fois sur 10 les bras et les jambes sont en croix). Chez 4 enfants sur 5 l'altitude est nette en extension.

2. Les mouvements spontanés.

- p^{ot} t^t le 1^{er} mois, mouvements spontanés et d'extension

BnF
MSS

c'est le Bewegungshörn. Crois^m et décroiss^m
des pics ("bille le briquet" Wallon)

- à 1 mois vers 1 mois; main apparition de mouvements : torsion du tronc; surt apparition du mouvement latéral (extension et bras) - vers le 5^e jour la fréq^m de ce mouvement augmente : 7 fois sur 10.

- à partir de 2 mois : les mouvements se font surt en extension (sur 7 fois : 6 fois en extension, 1 fois en flexion)

- ~~vers~~^{2^e} 3 mois, les mouvements en flexion deviennent très rares, l'extension varie; le mouvement unilatéral des membres devient marqué.

- vers 3 mois : le mouvement en extension recommence à dominer; le mouvement unilatéral réapparaît - des gestes de préhension apparaissent

3 Le réflexe

Le réflexe plantaire est fort en flexion au moment de la naissance.

- puis à partir du 15^e jour il est ~~fort~~ en extension de + en + souvent (5/10 à 15 jours, 7/10 au 25^e j., 9/10 au 60^e); puis l'extension diminue (4 fois/10; le reste en flexion) vers 2 mois; puis augmente à nouveau (entre le 65^e et 72^e j.; 8/10); puis baisse (5/10 et 3 lettres ouest); puis augmente à partir de 3 mois