

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.](#)
[Item\[Les manifestations motrices spontanées chez l'enfant. Marcel Bergeron \(suite\)\]](#)

[Les manifestations motrices spontanées chez l'enfant. Marcel Bergeron (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b044_B_f0212**

Source**Boite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Concl :

1. Il y a 1 hypertonie physio du nouveau-
né qui prédomine au niveau du fléchisseurs.

Mais Baruch a montré qu'on ne peut superposer
cela à la catépie (pas de ~~une~~ effort actif pr
prendre et conserver les positions imprimées de
l'ext.)

2. Il est vrai, cf le Dr Schachter que la
motilité du nouveau né s'exprime par des
déranch^{mt} en masse; mais le mot ^{est} mot
sur H observés aux extrémités distales. Ils
sont symétriques et bilatéraux

3. Le mot unilatéral se fait avant 3 mois :
or la myélinisation du faisceau pyramidal
(volontaire) se fait à 5 mois - De ce mot
n'est pas la série de mot différenciés.
Noter que ce mot apparaît au même sur^{entation}

4. Le reflexe planaire est défini cf /
reflexe de souffrance pr Minnowski -
le refl. en extension est défini pr von Woer-
mann cf le vestige de fonction perdue :
adaptation de la vie terricole du pied d'insecte
où le gros orteil peut encore s'opposer aux
autres orteils.

5 On trouve aussi chez le nouveau-né un réflexe de "précipitation à terre" : l'enfant en pleine flexion, si on le "précipite" : extension des bras, fermeture des yeux. Ce réflexe n'est sans doute d'origine méencéphalique et le nouveau-né

- en sujet de le système pyramidal est déficient

- ce qui se passe lorsqu'on laisse tomber l'animal dérivé par action au niveau du noyau rouge.

6 Trois grande variabilité engendrée de l'homme en réponse : qu'on n'obtient pas ~~une~~ les resp, pendant la malade