

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.](#)
[ItemEmbryologie du comportement](#)

Embryologie du comportement

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0213

SourceBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

chap X. Le Foetus - en fant.

A. stade primitif (28-32 s)

L'âge foetal de 28 s. marque la limite de la viabilité.

1/ Pas de distinction manivie et bien branché entre activité et repos. Torpeur continue ; non structure et le temps / peut peut d'éveiller des activités rigères ; mais le réveil n'est jamais complet. Pas de cycle temporel d'activité.

- Les mouvements sont sporadiques ; vagues brèves d'activité : en supination, la tête est inclinée de côté, avec quelques mouvements de rotation ; mouvements latéraux et verticaux - du regard à la lumière et au son : courtes phases d'activité (clignement, respiration), puis immobilité atteinte - on peut obtenir 1 rotation passive de la tête, à partir d'une rotation du tronc.

- Il y a de gros différences individuelles (le tonus est minimum en pronation) ; le tonus n'est pas constant ; au dessus d'un certain niveau minimum il est variable (perlocution tonique) -

Le tonus cervical régional à l'extrême, nous paraît hasard, mais en choisissant les régions où les fonctions neuromotrices naissent - De l'ature.

BnF
MSS

en mosaïque. Mais la consociation des gains de croissance se fait d'une manière unitaire.

Ex la pce : activité motrice unitaire des groupes musculaires (un long, tout allongé); activité des occluso-moteurs, des pupiers - fibrillation de la pce.

- La respiration est superficielle, irrégulière et décalée vis-à-vis du temps. Elle ne peut pas s'unir avec des neur. associées (en)

- Capacité de suer et d'insérer, mais pas de continuité - utilisation de la cuiller nasale de Buchin qui provoque facile $\pm$ réflexe de déglutition.

On ne voit pas qui relie ces récifs de l'activité tonique. mais on voit d'abord que c'est une organisation des "formes organisationnelles": "la cause changeante de la distribution tonique, et l'incidence proportionnelle des signes d'activité sur les canaux par les mêmes producteurs des structures de la motivation" (1923)

B Stade moyen (32-36)

Pas d'innovations capables de le dépasser du côté; mais $\pm$ gain défini dans la lecture et le type de l'activité motrice

a/ Le tonus: l'activité posturale forme des modes définies et organisées, + hâle que des petites notes localisées - D'autre part, son niveau de base est plus et sa valeur minima a $\pm$ sa valeur moyenne; il est moins fluctuant.