

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]](#)[CollectionBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.](#)
[Item\[Embryologie du comportement \(suite\)\]](#)

[Embryologie du comportement (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0214

SourceBoite_044_B-11-chem | Développement neuro-musculaire.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

b/ qd, stnd souven $\approx$ $\pm$ ^{exci} ~~excit~~ation, en embas, du bon, mais qui de fine vite

214

- $\pm$ recousse peut provoquer $\pm$ vrai bte refl. de

monro

- $\pm$ ion uncut $\pm$ onde d'acti te corporelle

- $\pm$ uif se bat lumineux $\rightarrow$ car. de hite, et

term+ure verre des yeux.

c/ En supination, mrd de horizon du bon, extension des bras.

d/ Si on pue d'un champ de vision $\pm$ anneau rouge de 4 roues, l'oeil s'inspecte ni le fixe : mais les yeux bougent de façon saccadée d $\pm$ brève poursuit.

e/ Les mains : $\pm$ esquette mine d chaque main est saisie.

En fin c/ est à émerger du t'btore unie vigilance : franche ouverture des yeux, activité assez brève.

BnF
MSS

C Le Fœtus - enfant mûr (36.40+)

a/ Le niveau gst de tous muscles est élevé; régulation thermique, respiration, rythme cardiaque tout mieux assurés.

b/ Le rythme de la veille et du sommeil est mieux structuré. Les 4 phases normales c/ sont à se différencier : endormiss^u, sommeil, réveil et vigilance.

- il tombe d le sommeil d $\pm$ plus + nette

- il revient l'oeil (pour tout, l'attention actif d le sommeil : les pupilles se dilatent)

- il se réveille en si court laps
- il demeure veillé avec le rôle de l'antipendule

cf le relais théorique des intégrations sensorielles
semble mieux déterminer :

- l'exemple d'immobilisation à son.
- il se réveille à $\pm$ gère, $\pm$ bruit
- cycles courts d'activité spontanée

S/ il immobilise en y voir en pseudo-fixation - et
ouvre les yeux qu'il entend certainement.

cf le tonus est $\pm$ élevé, surtout au moment du combat.
il peut surcharger $\pm$ combat. La tonicité peut être
si élevée qu'elle exerce $\pm$ effet restrictif, cf l'effet
au $\pm$ frein au muscle.

mais ce tonus est fluctuant : quand on met un doigt
à la main de l'ouïe, on sent la pression varier

Il reste attaché aux relations passives de la tête.