

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_044\\_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite\\_044\\_B-12-chem | Psychologie de l'Enfant. ItemLes besoins de succion chez l'enfant](#)

## Les besoins de succion chez l'enfant

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb044\_B\_f0231

SourceBoite\_044\_B-12-chem | Psychologie de l'Enfant.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

Les besoins de succion chez l'enfant 231

1) D'après les travaux de Levy sur le chien (1934) on a admis qu'il y avait chez l'enfant 1 besoin d'accomplir 1 certaine quantité de succion.

2) En fait Sears et Davis (1948), Sears et Wise (1949) ont montré le contraire:

- des enfants nourris à la cuillère dès le 1<sup>er</sup> jour de vie qui, par conséquent, ne font que ~~peu~~ de succion, ~~peu~~ de "non nutritive sucking" que les autres. Ils ont + tôt 1 certaine quantité de succion + faible.

- pour les enfants qui sont nourris ~~peu~~ de temps ~~un~~ ~~seul~~, ce sont ceux qui l'ont été le moins longtemps qui montrent le moins de signes de frustration.

Ceci prouve que le désir <sup>spécifique</sup> de "nursing" au biberon et au sein ~~est~~ en partie ~~à~~ ~~pro~~ ~~du~~ ~~it~~.

Dollard et Miller  
(Pen. and 4th. p 86)



