

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-13-chem | Socialisation de l'enfant. ItemCharlotte Bühler et Hetzer. Les débuts de l'intelligence de l'expression dans la première année](#)

Charlotte Bühler et Hetzer. Les débuts de l'intelligence de l'expression dans la première année

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0278

SourceBoite_044_B-13-chem | Socialisation de l'enfant.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Ch. Bühler et Helzer Le début de l'usage
de l'expression et la 1^{re} année.

278

2. f. y. 107. 1928. 50-61

① l'enfance connue du enfant se présente avec
l'figure amicale ou imitée

- jusqu'à 3 ou 4 mois, l'enfant ne tient pas
compte de la physionomie; réaction très positive
vers l'individu

- de 5 à 8 mois: l'enf. reflète la mimique
positive ou négative de l'expérimentateur

- à partir de 8 mois: réactions personnelles
variées qui témoignent d'interprétation véri-
table; la mimique est comprise.

C'est ainsi à 8 mois que l'enfant comprend
l'intonation.

② Le nouveau-né crie qd il en entend d'autre
crier (ceci de 0 à ~~11~~ 11 mois)

- il faut que le stimulus ait l'extension
durée qui décroît avec l'âge: 170"
des 3 1^{ers} jours: 94" de 4 à 7 j;
88" de 8 à 14 j.

- cette réaction diminue assez vite chez
les sujets habitués à la vie que chez
les isolés.

BnF
MSS

27-10-9
858

- de 15 j. à 1 an la prégée de la
reaction diminue, surtout si en 2
en Pnt ne peuvent le voir.

- De: (a) au debut la reaction est l'effet du
choc acoustique
(b) a partir de 2 mois, elle prend l'aspect
habituel.

- de 2 a 3 mois: l'effet de vibration
est plus marqué que celui de l'acoustique

- à partir de 3 mois: la reaction est
de plus en plus marquée et devient
habituelle.

En résumé: la réaction est plus marquée
à partir de 3 mois.

(5) la réaction est plus marquée à partir de 3 mois
(voir ci-dessus)

- il faut donc attendre 3 mois avant de
faire la réaction avec l'acoustique
et la vibration: la réaction est plus marquée
à partir de 3 mois.

- cette réaction doit être faite avec l'acoustique
et la vibration à partir de 3 mois.