

Les connexions linéaires

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0439

SourceBoite_044_B-22-chem | Tournay.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).


Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Elle n'existe pas à l'état simple : on peut aller de n'importe quel point à n'importe quel autre : les strychnins permet qu'en touchant l'organe n'importe quel point de la peau, 1 seule de réflexes s'éveille.

Mais la voie la + simple est celle du réflexe modifié (par exemple, l'arc réflexe de la racine dorsale de Kellie) : quand le p. est en contact avec le muscle, ceci



Ces réflexes sont proprioceptifs (sensibilité propre de l'organe mis en action). Le proprioceptif est le mototype du réflexe simple. On appelle aussi myotatique (étudié par Sherrington)

Par loi de Bell-Magendie pour la racine dorsale ^{ventrale} de la racine dorsale, et le caractère sensitif de la racine dorsale. (1822 sur 1 grenouille)

Dans certains motifs de la moëlle on trouve l'élaboration de certains fibres, qui s'entrecroisent dans les ganglions sympathiques. et en région lombaire et thoracique.


Le moelle se divise en 4 secteurs :

- secteur somatique moteur (efferent)
- secteur sensitif somatique (aff.)
- secteur viscéral afferent
- secteur viscéral efferent. (refl. viscéral. interoceptif)

du côté du viscéral afferent reliant le sympathique : classiquement on trouve des paires de sensibilité de système autonome.



Entre le système somatique afferent et le système moteur, il peut y avoir / neurone intercalaire, ou inter neuronal qui peut aller à la corne motrice ou à l'autre. Selon le cas, il s'agit d'un réflexe homolatéral ou latéral. Contrairement aux refl. extéroceptifs sont de ce type.



Les coupes longitudinales sont de 2 types : / non bala ou sagittales.

Coupe sagittale

cellules cordonnelles qui jouent / g d rôle et la distribution de l'intensité

