

Goût et odorat

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**044_B_f0449**

Source**Boite_044_B-22-chem | Tournay.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**


Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).



Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Le vue et l'audition sont excités par des stimuli physiques. Le goût est excité par des substances chimiques (ou du moins liquides ou gazeuses).

— Les particules qui ^{en font partie} ^{en fait} l'odorat ne peuvent pas être étendus sur la peau. L'odorat est le + haut des sens (dérivé du rhinencéphale). Il a l.s.n. éliménaires. Sur les bâts olfactifs, cellules olfactives (cel. de Schultze) sont à la fois réceptives et conductrices (ce dû par l'existence aussi chez les vers).



Il y a des glomérules olfactifs (avec au centre les cell. mitrales). De ci les fibres forment la bandelette olfactif.



Pour étudier l'odorat, on prend des substances simples: mais on ne peut mesurer de façon empirique. Zwaardemaker a construit l'olfactomètre. Elsborg (U.S.A) a pensé qu'il fallait diriger les odeurs sur la boche olfactif (en dehors de la respiration ordinaire: il projette l'écoulement vers la boche olfactif. En mesurant la pression et le volume du jet (ainsi que la concentration) on établit le seuil d'odorat.

identifiable minime. Il a étudié l'olfaction monotone, la fatigue, l'accommodation. Il a observé que le menthol (ou) l'ammoniac ont 1 action tactile (sur les terminaisons du trigèmine). Le chloroforme agit sur l'odorat et le goût.

Les centres: Jachian a observé que du supst. a fait des variations d'olfaction par crâne (crâne thoracique, par où qu'on les localise et les paires, mais de l'hypocampe. cette localisation n'est pas satisfaisante.





santé: structure pyramidale (symétrique). Allen a fait l'ablation de cette région sur des animaux conditionnés. Allen avec l'EEG a obtenu des dérives sur

le côté pyriforme: mais a montré au cat, on perd la base (pi. paracymbia a bout de synapse).

L'odorat n'est pas en relation directe avec le thalamus (le thalamus avec des vent. complexes jusqu'aux centres de l'aud. affective). Un émonome situé le goût et le goût, mais il n'est pas un.

Le goût Papille caliciformes: l'ensemble est formé de cell. gustatives (avec 1 cili) et de cell. de soutien. La cell. de soutien est apte à remplacer les cell. gustatives qui se font et disparaissent.



Acide - sale - amer (gustatif)

