

[Les régulations (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**044_B_f0457**

Source**Boite_044_B-22-chem | Tournay.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

de cervelle après la régulation sur l'équilibre²⁵
(connexion au vestibule). 457


Néanmoins on a vu que l'information par la
système de la tête et du yucc. Pour l'inst. l'excitation
électrique sur le verrou l'achève sur ~~l'excitation~~ tous
(Bremer).

Il y a l'organisation et régulation depuis
le. Bremer a aussi étudié le reg. végétatif
avec le cervelle on a donc la régulation motrice

Il y a des reg. sensorielles: adaptation du nerf aux
mouvements qui l'excitent. Brouwer et Wallenberg
se sont penchés, indépendamment, la même question. Brouwer a
trouvé une fibre qui allonge en une minute de
celle qui reçoit les stimuli. Brouwer a fait la
cartographie de l'isthme. Wallenberg a étudié
le même chose, et a parlé de 1952. influant sur le concept.
Peel reprend la question: que fait ce l'ancien
symptomatique du l'isthme qui ne viennent pas de l'isthme
motrice, mais + 10% des ~~articulations~~ inhibition.



Le système sympathique.



Par tout il y a un de
ganglions que de même de
la moelle, sauf au niveau
cervical où il y a qu'un
grand ganglion

Depuis 1727 (Poursour du Petit) on sait
qui amène qd on coupe le symp. cervical Haller
a remarqué l'écoulement d'un nerf rachidien
et le symp. le rameau y étant gris qui rejoint
le chœur sympathique à la base. Haller a
remarqué des r. étant blancs, mais seulement depuis
le h^e de la moelle thoracique jusqu'à la moelle
lombaire.

Yaskeff a vu qu'il fallait trouver le
r. comm. ~~gris~~ ^{blanc} qui se trouve unissant le symp. à la moelle
Blanc ———— à la moelle

Dungley en faisant des touches de nicotine sur les
ganglions, notait l'élément allant à la périphérie
et l'autre à l'intérieur.