

[Les régulations (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0458

SourceBoite_044_B-22-chem | Tournay.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits


- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Pregangl.


col. intermedia laterale 26

458



postgangl.

La voie finale q^{ue} du symp. est celle
du nerf v. a. p.



III (moteur oc. c/v)


x (Pneumogastrique)

Pregangl.
col. intermedia
laterale
x
nerf v. a. p.

BnF
MSS

Avec la corde du tympan
c. Bernard a obtenu des effets vasomoteurs
On a étudié la contraction et la dilatation
de la pupille, le rapport avec le cœur. Ainsi
petit à petit s'est établi le schéma des nerfs du
végétatif : le sympathique, et l'autonomane
(que dans les nerfs parasympathique).

schéma du végétal



D'excitation du symp et de la surrenale
 provoque 1 secr. de cette gl. (adrénaline). Elliott
 s'est demandé si le symp ne marcherait pas avec cette
 substance. Cannon a montré qu'on peut mettre
 en circulation 1 substance qui rend anormal le cœur.
 Ils ont appelé sympathine

Loewi (de Göttingen) a pu transporter le liquide
 intracardiaque d'un cœur excité, d'un autre cœur: il
 appelle cette substance Vagusstoff: c'est de
l'acétylcholine

Ce fut la grande période de l'adrenérgisme médiateur
 Dale a classifié les adrénergiques et les cholinergiques