

Rôle des hémisphères

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b044_B_f0500**

Source**Boite_044_B-24-chem | Pavlov.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Rôle des hémisphères.

500

"Chez l'animal sup^r, les comparaisons essentielles en + complexes entre l'organisme et le milieu environnant, par la perception de l'individu et de l'espace, sont d'abord conciliées par l'activité des centres corticaux en + rapprochés des hémisphères.

Ces activités sont en recherche de la nourriture... et de l'évitement du danger... on les appelle en g^l instincts, ou xologues ou nommés émotions. On les désigne par le terme de "refl. inc. en + cycles".

... La 11^{de} fonction des g^l hémisphères, au cours de l'évolution ultérieure, consiste à associer ces ref^l d'innombrables excitations conditionnées à une limite d'excitations inconscientes et innées. Autrement dit : à compter est le le ref^l en inconscientes par les conditions.

En conséquence les instincts sont satisfaits de + en + complètement et progressivement. Ce qui veut dire que l'organisme se maintient de + en + sûr^{ment} et le milieu environnant.

Dic. au g^l de Rome

1 "2 + des μ les fonctions des gcs hémisphères
conviennent à former des liaisons temporaires"

2 Les gcs hémisphères sont des "analyseurs"

3 L'activité des gcs hémisphères consiste en
l'analyse et synth. incessante de influences
du milieu" (O. Chavannes. 1949. p. 452)

"L'activité fonctionnelle Ca^{++} et g des gcs hémisphères
est l'activité de signalisation variable qui
reçoit 1 quantité innombrable de signaux."