

La distinction des excitants complexes

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0520

SourceBoite_044_B-24-chem | Pavlov.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La disinction des excibuts complexes.

520

Des excibuts complexes : "Puisqu'il s'agit d'un système, les éléments ont bien entre eux une action réciproque. Les 1 sur les autres nous servent pour l'étude de cette interaction"

"La succession d'excibuts leur répétition et le temps soient les facteurs qui déterminent le résultat final de l'excitation et donnent la valeur quantitative et p.r. qualitative de tel excibut complexe."

O. TIV. p 125.

Ivanov Smolenski, étudiant l'action réciproque des composantes d'un excibut sonore a montré que 4 excibuts sonores qui jusqu'ici provoquaient chacun 1 réponse, fusionnés en 1 tout, perdant complètement leur efficacité.

De " Il le complexe agit y 1 excibut complexe unique, ce qui revient à dire que 1 processus d'intégration (synthèse complexe) a eu lieu dans l'hémisphère."

in Travaux du Labo de Pavlov

Il. Smolenski - Raison 4. p 64.
Soხოლო

