

Le problème de la fusion et du mouvement

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0763

SourceBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. [B]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

1/ Exp^u de Ternus.

* $\bullet$ = 1^{ère} exposition . $\bigcirc$ = 2^{de} exp.
} $\bigodot$ = le point est exposé 2 fois à la même position
suit 1^{ère} exposition de ce type:

$\bigodot a$ on voit a au repos et
d'autre figure se mouvant
de B en C
 $\bullet b$ $\bigcirc c$

soit 1 autre exposition de ce type
on voit 1 figure b qui
vient en a et 1 figure a
qui vient en c
 $\bullet b$ $\bigodot a$ $\bigcirc c$

Dans la 1^{ère} disposition, la fusion se produit
entre 2 points exposés à la même place, et entre 2
points distincts ; et la 2^{de}


- An y a fusion entre 2 figures exposés
à la même place (a)
- mais a se fond à la fois avec b
et avec c

Ceci prouve que la fusion dépend d'autres
facteurs que de la proximité spatiale :
"l'identité" phén^o est primair^{em} déterminée



pr la gestalt identite." (Ternus.
Exp^{de} Untersuchungen über phänomenale
Identität. ψ Forsch. T VII. 181. 1936
1926)

2/ Exp^{de} de v. Schiffer.

Une disposition cf celle-ci : 
peut provoquer 1 mouvement
scopique et 2 les uns des aiguilles
et montrait ou de l'un inverse.

on dit traditionnelement que c'est 1 question
d'habitude du sujet. v. Schiffer veut prouver
que ce sont les facteurs d'organisation interne
qui provoquent la selection ; et que les tests
de Wertheimer pr l'organisation du formes
stationnaires valent également pr la selection du
mouvement scopique.

Par ex si a_1 et d_2 sont rouges sombres
et b_1 et c_2 verts clairs, le mouvement
de l'une des aiguilles et montrait.

Le ressemblance des figures l'emportant sur
sur l'angle (c'est-à-dire les angles très petits qui
sont supérieurs)

Dans la figure  le mouvement est perçu le +
marqué cf 1 rotation autour d'axe horizontal
bf et travers la 3^{ème} dimension ; + prenant