

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-48-chem | Grassé. Item\[L'effet de masse chez les animaux \(suite\)\]](#)

[L'effet de masse chez les animaux (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0886

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- chez les carassins dorés (voisins) de voir
 déjà apparaître les stimulations induites ^{de l'animal} ~~à la~~
~~pour éléphant no plus g. color~~
~~de l'animal en chimique~~

- le group ω provoque Δ du métabolisme
 et de la consommation en O

- des carassins groupés mais aveuglés
 par 1 verre opaque ne consomment pas
 que s'ils étaient isolés - 1 individu
 isolé de ses congénères par 1 simple verre
 augmente sa consommation en O.
 (comme le miroir).

- Veltani, élève de Pearl, étudiant les
 souris blanches : les individus groupés guérissent
 à la fois leurs écorchures que leurs isolés (inter-
 lechages qui diffèrent les antihistogènes).

BnF
MSS

