

La physiologie des sociétés animales

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0889

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La physiologie des sociétés animales.

Travaux de von Frisch, de Porembé (surtout des
la verte' bris) ; en France (inverte' bris) - de Norvegien
Schjelderup Ebbé, professeur a montré ^{que} les sociétés
animales et sont hiérarchisées.

Définition du fait social

Les group^{es} animaux ont p^{ro}pos des significations
sociales. Il y a l'interaction stable de animaux
entre eux et dans la recherche de la nourriture

A group^{es} non sociaux

Les group^{es} d'animaux : Les animaux sont groupés
qu'ils restent entre eux en liaison sociale. Parfois il y
a des animaux qui sont en liaison sans group^{es}.
La femelle du Bombus attire le mâle à 500m de
distance (mais la femelle ne voit pas le mâle).

Le animal^{es} est l^{es} symptôme, l'appareil derrière la
quelle se cachent des réalités diverses.

Population : ensemble d'êtres vivants d'une (qui
est arbitraire, ou arbitraire individuelle ou d'une
géographique). Le group^{es} le + simple est la
population.

1 group^{es} des à 1 individu c^{es}

non il y a des populations qui se complètent
 parce qu'entre les individus il y a des liens de dépendance
 indirecte (biocénose). Aussi : 1^{re} couche d'immensité
 1^{re} couche d'individus (mouches Musca)
 2^e couche la corruption c/4, 1^{re} escouade (Calliphora
Lucilia)
 elles pondent des larves qui deviennent leur nourriture.
 3^e d'où apparition du neurophora (coleoptères).
 Au bout de 3 mois les mouches ont fini leur œuvre
 4^e une escouade de coleoptères (Dermestes) qui
 se nourrissent de graisse.
 5^e la légion des Acaridés consomment les saies
 6^e enfin les Attagènes, les Tenthredines (coleoptères)
 des teignes absorbent le poils et la peau d'écaille

Il y a des milieux très + riches : c'est le fruit d'A. Auré-
 éant, les liges finissant ; de pin d'arbres, de
 flore herbacée, et l'œuvre des petits rongeurs
 particulièrement. Depuis la disparition des liges, l'œuvre
 d'arbres s'est développée, avec l'œuvre n°1 (œuvre,
 mammifère).

biocénose et les lacs, dans les arbres creux.