

[La physiologie des sociétés animales (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0892

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

si on place sur l'ey l'entête qui tourne avec

891

Prudes blanches et noires, la grenouille, elle utilise
et hôte d'1 certain sens (reactions opto-motrices).


on a étudié en reactions d'1 Bar, avec ses
propre image; en déplaçant le miroir on obtient le
e-animé le mot qui n'est.

Le groupe des pseudosociaux

Il y a des groupes pseudosociaux.

des Ophiures (sortes d'étoile de mer) vivent divers sur
des supports; si on place des lagunaires des ophiures, les
ophiures se groupent et ont leur hôte. Si on ne prend que
2 individus, on résulte: il y a interaction hôte-vie.

Pour l'étude de l'interaction, on les introduit
~~dans l'aquarium~~ l'aquarium de l'écoulement de l'eau de mer. Au bout
de qq temps, les individus se sont de noué, les ophiures
se superposent sur les branches. Il y a en Thigmotaxis



tactiques: ils recherchent à
placer leur corps sur l'un ou
l'autre, sur le + gros sur l'autre
petite.

On ne peut en conclure (orthèse urticaire)
qui ont 1 hôte lors thigmotaxis.

si on les place d / reciprnt place, elle se groupent
et on se superposent.

Des facteurs de l'interattraction.

A Affection sociale

~~Il y a 2 autres facteurs de l'interattraction~~

Wheeler invoque 1 appétition sociale : une
impulsion agit c/ l'impulsion ^{qui} provoque l'activité
de chaire, en dehors de M s stimulés. Il y a la 1
besoin. on ne sait à quel mécanisme physiologique
rapporier cette impulsion.

Des 100. de vertébrés s'exerçent mal en l'absence de
de l'attraction. 2 facteurs

- { — interattraction externe
- { — impulsion interne.

Des réactions à l'isolé du chimpanzé montrent
à l'évidence cette impulsion. qd on isole 1 chimpanzé
+ si c'est 1 jeune, il a des réactions de peur très
vives (phéno physiologiques aux égards à l'émotion
humaine : cris, gémissements)

3 l'adulte : réaction de colère (comme les bonobos)
la cage ; qd s'est apaisé, prostration ; puis de
n° acc de rage qui durent 10 jours).

Yerkies : "1 chimpanzé isolé + 1 chimpanzé"