

[La physiologie des sociétés animales (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0894

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

surflécolèrent au moment de la reproduction. 6

Chez certains mammifères, il y a une territorialité : il y a formation de groupes très nombreux, au m^b de l'échelle sociale ; mais à l'int^r du groupe, il y a des couples (marmon, chien de prairie). Or les troupeaux d'oryx (Antilopes), il y a une échelle sociale ; mais l'association sociale joue avec monogamie (couples très étroits). Or chez les Cétacés.

④ En 1932 Zuckermann a prétendu que les 100. de verbeaux choient dus à l'échelle sociale (sur les images Babouins). Pas de 100. permanente, d.t.p. il n'y a pas de 100. cachée : c'est presque le mammifère à tout, n'est pas de 100. stable. Chez les Primates, la 100. est stable presque le mâle est typique à se reproduire et le cycle sexuel de la femelle très rapide.

Mais Zuckermann a étudié des animaux excités au x de sexuel (à cause de la territorialité). Les travaux de Carjunt l'ont montré. Les 100. de Primates ont fait de harem : le mâle a plusieurs femelles.

L'impulsion sexuelle tantôt empêche tantôt excite l'association sociale. Il faut de la discussion.

La société et la famille

on a vu souvent de la famille l'origine de la soc.
Ceci ne peut être généralisé.

Revenons aux soc. ou la famille n'est typ.
des soc. familiales durent peu et se désagrègent. La
famille est souvent incomplète (exclusion d'un sexe).
elle se dissout qd les petits prennent le nourricier (cf chez
les araignées). Oiseaux et mammifères (félins) ne
changent pas.

Pourtant les soc. les + haut^m organisées sont
familiales (tous les membres de la communauté sont
pères ou sœurs).

Ni la soc. ni la famille n'interviennent
dans les gdes soc. et gregariens est distinct.

Chez les mammifères, il y a des familles et des soc.
Les sociétés sont exclus de la soc., ils existent chez
les autres vertébrés se distinguent de la soc., en intégrant
à la famille. Ainsi de la troupe de chevre sa-
vages, il y a des harems avec 1 seul mâle: qd il
meurt, le groupe s'intègre à d'autres harems.
Les élans forment des petits troupeaux d'adultes
mâles et femelles. (dans les cachalots).

Les jeunes cerfs vivent avec leur mère; mais au bout
d'un certain temps, ils forment des troupeaux.