

[La physiologie des sociétés animales (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0895

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Ceci le produit au m^t ou les mener nombreux
période de reproduction. 894

Chez les éléphants de mer : chaque mâle domine
un harem ; le célibataire forme 1 troupeau
qui essaie de devenir le mâle.

^

Structure des grds types sociaux.

Impossible de classer les types sociaux.
Faune de l'Afrique qui comporte des milliers d'espèces
ne compte qu'une infime minorité d'espèces sociales.
Il y a eu de nombreuses évolutions sociales.

D'où classification purement didactique.

La coopération s'opère entre vertébrés - invertebrés.
Chez les vertébrés comportent les + adaptatifs

A Invertebrés : sociétés primitives

BnF
MSS

1 group^{es} incoordonnés et temporaires : très
fréquents et peu étudiés ; petits rassemble^{ments} de planes ;
des gyres (qui tournent en rond sur l'eau), des
germes (qui glissent sur l'eau). Punaies rouges
et noires (qui se rassemblent par milliers au pied des herbes).
Petits rassemble^{ments} le long du golfe du Bénin (phéno
de ménomé).

Sociétés de mâles. Chez certains insectes, les mâles se réunissent au crépuscule sur lieu déterminé (grainiers) : ainsi chez les Abeilles (Halictes), les Bourdons, les Ammodontes (charmes de ~~parc~~ champs).

Rabaud pensait que c'était le phéno soc. le + élémentaire.

Et j'ai été compliqué (rythme nyctheméral; monosécure); il se rencontre chez les espèces toutes les années aussi chez les autres. Importance de la mémoire.

Chez certains les femelles participent de temps en temps, ou continuellement; chez d'autres, les femelles et les ~~et~~ le mâle blanc ce point.

La signification de ces rassemblements est énigmatique.

Il y a des rassemblements liés aux saisons : rassemblement hivernal des coccinelles.

- action du milieu liée à 1 rythme physiologique interne.
- mais pourquoi l'individu individuel (grasse sur le relation de Gergond.)

2 groupement sans action mais coordonnés

- soc. des larves de Tenthredines : soc. simple mais coordination serrée

- soc. de migrations : les insectes migrants ont / coord. complexe