

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-48-chem | Grassé. Item\[La physiologie des sociétés animales \(suite\)\]](#)

[La physiologie des sociétés animales (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0896

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- ① il y a rassemblement, et coordina-his des vents ?
 ② se réunissent aussi rassemblement sont possibles à des
 phéno : il y a du vent de poule qui dominent les phéno
 sociaux.

895

certaines espèces de papillons et de libellules ; les vases
 de Chardon (Europe septentrionale) provient de l'Asie/Asie
 du N. et traverse le Méditerranée ; à l'attachement très forte
 à l'axe de ses libellules : attachement à base visuelle ; les
 recherches opto motrices sont très intéressantes. il y a des
 centres de migration (Rido méditerranéenne ; Charente
 Marítimo).

les larves de *Sciara militaris* (larves) se rapprochent les / des
 autres et sont ungués et le mucus qu'elles sécrètent et
 elles constituent une colonne de 7 ou 8 rangées (le tout
 mesuré sur plusieurs mètres).

chenilles (*heliophila unipuncta*).

intra-attachement - coordina-his des vents

des migrations d'insectes sont à leur unique (un
 Amérique, nord du Mississippi).



3 Soc. coordonnées avec œuvre collective

1 Soc. sous la jannipier ou nax : rond de de port
 1 ou plusieurs routes. elles sont représentées par des carrés
 de papillons ou de Ten Hrodes ; cela vient dans des vents

soy une (Procellonactes du pin, processionnaire du chat)

2 types de Bourso: | en colent du rameaux
| simple r/rage

La procession est située au n° 1, 3, 5 ... 35 ou 40.

La procession est / phère compléte: si on place 1
pinceau muni de fils sur la tige et chenille, on peut
connaître la chenille où on veut.

En 10e. caractéristique des Bourso; mais la coordina-
tion n'est pas parfaite.

2 Soc. qui peuvent devenir pluri / annuella: soc.
d'araignées qui peuvent couvrir de chenilles sur / sous / (sur
arbres): Néer 3 uela. de vid'indus dans park les
trous sur la place publique.

chez les stégodyphus, on voit 2 couples, et la
progeniture n'est pas multipliée mais reste groupée.

B g des soc. d'invertébrés hautement organisés

1 Il y a des castes: de la 10e. d'Araignées, on y a
de différences soit de la morphologie soit le comportement
ici on y a des castes. Au n° de départ, 1 couple
ou 1 femelle / 1 mâle (hyménoptères). 2 Abeilles
La femelle pond des œufs, et on voit dans diff. types