

[La physiologie des sociétés animales (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0897

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- du neutre (petites ouvrières) : castes
- du mâle
- des petites pondérables.

896

de nombreuses œufs porteurs de germes, les autres
provenant d'œufs fécondés. Chez ces deux groupes
(Béciton, Anoma) il y a aussi des soldats : un
en fait le rôle des ouvrières, avec l'oviposition ~~et~~ métrique
majorant de la tête. Chez les abeilles et les guêpes il
n'y a pas de soldats.


Les ouvrières d'abeilles et de guêpes ont l'oviposition ~~et~~ métrique;
celles des fourmis, des termites. Les ouvrières d'abeilles ont l'
arsenal de glandes qui ont des fonctions : anti;
+ gl. mandibulaire qui fournissent la gelée royale)

3 chez les fourmis les ouvrières sont aptes, les reines ont
des ailes.



4 chez les Termites, les diff. morphologiques sont
f. de 5 à 100. et (mâle) par couple (mâle et femelle, noirs,
yeux composés, appendices, partie de la tête) quelques yeux
mâle et femelle, la femelle pond des œufs → neutres (mâles ou
petites castes) aptes, aveugles, dépigmentés. Tous
princip. Deux mâles ou les ont leurs mandibules pour
ils peuvent l'utiliser à de nombreuses fins -/ ils ont des
glandes salivaires bien fournies → d'où sélection
des castes des soldats, qui sont nourries par les ouvrières
aptées, dépigmentés, hypertrophie de la tête avec

d'énormes mandibules ayant des formes variées; ils peuvent lancer de la glu ou du lait. Il y en a qui canent du gaz asphyxiants



Chaque caste a son langage, et ce chaque caste en un individu peut avoir du même précis (absolue) un peu chez les termites.

Les yeux sont très étroits

C Sociétés de vertébrés

Soc. de vertébrés: Tout est le langage (voir: Carpenter sur le gibbon et les singes hurleurs).

Soc. coordonnées simples: bancs de poissons; permanent d'un individu; coordination opto motrice.

des individus se réunissent temporairement des animaux de la cage. chez les (bancs monogamie temporaire) (Poretsky). Rapports chez le corbeau et l'occlusion et coordination temporaire.

chez les manchots monogamie temporaire.

Chez des Bonides sauvages (Bœuf musqué) de petit trou. veuve avec / mâle dominant. Soc. d'anthropes de traits combinés d'anthropes (avec traits mâles).

Plus uniformes de la coordination: hiérarchie de dominance.