

[L'influence de la société sur l'individu (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0900

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730


Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021



3 De 15 pr la
volatilité : 1 m
n'est de poules
peut perdre de
110 à 150 œufs
par tête selon
espèce et lieu
à chacun.

4 Étude sur 1 petit Coléoptère (Tribolium confusum)
faite par Park, élève de Pearl. La réaction de
+ l'axe est celle du couple isolé; qd l'un des
couples $\rightarrow$, l'autre $\rightarrow$; (certain ophium de plus;
la réaction $\downarrow$. ~~Il~~ effet du Tribolium est
à travers le prisme, et ils interagissent leurs œufs; il
y a 1 ophium où l'autre est stimulé par le même
est sup. à la consommation.

5 0. m pr le troupeau : il y a 1 ophium; os
le kenia, le troupeau d'éthiopie est toujours
composé de 4 individus.

3 Effet de la nature et l'âge en fait.

Le group^m peut avoir des effets nocifs sur les
individus; effet d'inhibition, de parasitisme,


de direlle; c'est par l'absence de la Farr (de même aussi chez le homme).

Pearl a montré que ds 1 bouteille de 450 cm²
~~avec~~ 20 ou 50 individus on les a g de/condite
chls + g de longevité.

4 Effet de masse sur le sexe.

Sait le coque Propeiduca (qui vivent sur les
groupes de moules; le mot phrygien ne s'explique); ce sont
des animaux qui changent de sexe. Ils vivent
groupés et amovibles. Les 2 sexes, en c/quantité

les 2 sont très femelles; en
3^e et 4^e sont femelles; les
autres sont mâles.



1 crepidula sont femelles;
1 en 100 à côté 1 carré, elle

devent mâle. Coe a montré que c'est la
c/fluence du group^{es} de la ~~masse~~ la masse devent
femelle: en 1 femelle avec les + 2 mâles.

Hartmann a étudié le cas de l'Ophiotharax
rueritii (un mâle de gde taille): si on prend 2
femelles et 1 mâle et 1 local; au bout de 9 jours
seulement, il y a 1 mâle et 1 femelle; il y a eu
inversion totale. Si on avait pris 2 mâles, l'inversion
aurait été plus difficile à obtenir.