

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-48-chem | Grassé. ItemOvulation provoquée chez les oiseaux](#)

Ovulation provoquée chez les oiseaux

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0903

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

III) Ovucahm provoqué chez les Oiseaux 902

1. chez l'ait : chez les Mouettes Larus, la ponte est im-
possible chez les femelles isolées. Groupées (à 20 env.) ponte normale.
1 femelle de canari pond très mal; elle pond, en présence
d'une femelle 8 ou 10 " après le rapprochement.

2 Pigeons pondant. 1 pigeon isolé et l'autre cage
et visible provoque la ponte chez 1 pigeon isolé. Harri-
son obtient 1 ponte normale avec 1 miroir et la cage
d'un pigeon isolé; de même la femelle.

C'est + qu'il faut, c'est la situation : on pourrait isoler
et étudier le rôle du mâle.

2. parade sexuelle : Darwin pensait que la parade jouait
un rôle et la recherche sexuelle (paradisien) de qu'on est
sans des vœux marqués, avec à la porte du tas de cailloux
synchrone; c'est là qu'il a vu la parade). En fait la
chute de l'oeuf est l'ovoducte et la ponte ne sont possibles
chez la femelle que si elle a assisté à la parade de mâle.

Explications physiologiques : moins hypothétiques
que chez les insectes : la lumière a 1 infl. certaine sur
la hypophyse et sur le tractus génital (Benoît
et B. Drenth sur l'Éthologie et la Tuerie)

des hypothèses sont en cours.

BnF
MSS

IV) Effets du groupe sur le C.S.

Ex. du crabe.

: l'effet de groupe développe l'interattraction; groupes
sont + sensibles aux trophées, aux toxies. On voit
de fois qui ont l'air de l'imitation, marquant
du parangisme. (neuro imitation exp. de g. rui).

L'imitation n'apparaît que chez les Primates
malgré Guillaume, le terme de "mimicry" est hétérologue.
On dit aussi mimétophore (Poisson, libellule,
crabe).