

[Physiologie des sociétés animales (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0910

SourceBoite_044_B-48-chem | Grassé.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

20
Chez les fourmis : la fonction du roi le
fait de leur donner des fourmis : enroulant, l'acte
humain et sans parler / fourmi leur : est la part
neutroïde.

Reproduction + une femelle et 1 cellule : mais associée
aux qui se remplissent (d'habitudes ~~avec~~ jusqu'à ce qu'il
~~il~~ n'en reste qu'un).
On trouve les a une en eux-mêmes qui ont leurs
mères (d'après niger).

Fonction dépend de la femelle : leur rôle
peut varier / ce rôle : elles ont à leur disposition
à leur retour : et leur part des ressources de la
espèce du même espèce.

fonction par occasion : la fourmi leur → action
collective pour répondre à la cause et les femelles
peuvent. Au lieu de devenir étrangères - chez
Formica rufa et formica ruginosa.

Formica rufa peut avoir 1 comportement différent :
les femelles peuvent être reproductrices et / coloniser
qui a déjà / reçu, ou qui n'en a pas. Parfois
elles ne se contentent pas de l'opportunité de la part des
occupants. ~~Il y a~~

Formica ruginosa pratique la répartition de F.
rufa : les femelles ruginosa ne se font pas
adapter par leur propre usage, elles sont chez
Formica rufa → parasitisme social.

Le parasitisme social.

Les fourmis mineuses de F. exsecta
recherchent en fait de F. fusca : elles essaient
leurs occupants, mais elles - ci les dominent

au bout de qqes générations (la reine distendant
de parasitisme soc. peut récroître.

F. praecox part : répartition de / nids de F. Funca
substitution des ouvrières aux nids et sacrifice
de la reine de la soc. primitive. Les femelles des
espèces voisines sont de petite taille (microgy-
ne), favorable à l'adoption.

Bothriomyrmex : les femelles adultes sont très
petites. Elles répandent le même odor que les fourmis
du genre Taraxoma ; les ouvrières de B.M. ne
répandent pas le même odor. Les r. enlevant
sont adoptées par les Taraxoma : l'intruse perd
à la recherche du fondement, leur nombre sur A.M., et
leur branche la tête. Beaucoup de fuite chez les
Taraxoma. Les ouvrières des Taraxoma évitent
les dros. des B.M.

Fourmis en languette (genre Formica (part))
et fourmi sanguinaire : la fondatrice est incapable
de donner naissance à / n^{elle} soc. d'adulte